Bouresla

Vass7R13s386-390

0Mtp150

Johnson Sport

Collection Vassal-Montpellier

Bouresla 7 R 13 s. 386.390





ANNEE 4993 NOM Bouresla. EMPLACEMENT 7R130.386.390 .
Bd. 8.89 ni

Souche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb		Nbre grap	Ferti- Floraison début mi/f fin		Véraison début mi/v fin			Maturité		
1 8 2 8 3 9 4 8 5		25.3	5.4~		Grappe Pour : Baie :	: G TG - (disc-sp : B-(: s : avec	M - P Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a c - ap	Dim 1; - P -ov-o Rg-N r - fe	Dim: bov-cy: Jus ox - he	Compacture of the Compacture o	cité	13.9 +4 : L - M- C

ANN	ANNEE: 1994														
NON	1 Bo	wes l	a		EMPLACEMENT 7 R 13 & 386 . 390										
n	ni.														
Souche	Nbre yeux	Débourrement Ubre début mi/déb grap		Ubre grap	Ferti- lité		raison mi/f		Vé début	raison mi/v	fin	Maturit			
1 2	4	17.3 24.3	213 ×	0	2										
X 4 5	3	173	26.3x 28.3.	* 4	Crappe: G -M - P Dim: Compacité: L - M - Pour: Mill: 4. Baie: TG - G - M - P Dim: 26 x 23 disc-sph(ell) ov-obov-cyl-fus Couleur: B-Gr-Rs-Rg N Jus: inc - coloré Saveur: S - m - ar - fox herb Pépins: avec - apyrène Port: A waye Vigueur: 2,5										

ANNEE: 1995

NCM Bouresla

EMPLACEMENT 7 R13 1 386.390 .

doutonlootonlootonlootonl

ouche	Nbre yeux	Débourrement début mi/déb						Véraison début mi/v fin		Maturit é		
1 2	6 5	13.3	23.3 *	0	0,5	2.6	4.6	7.6	-7.8	16.8	28,8	11,9
3 4 5	6421 De	20,3 £3,3 £7.3.	30,3 27,3. 95(+10)	101	Couleur Saveur Pépins Port :	TG - G disc-s r : R-C r : s - r : avec	Mil. sph-el: Gr-Rs-l m - a: c - ap:	l: - P D: 1-ov-c Rg-N r - fc yrène	im: obov-cy Jus ox - he	yl-fus : inc erb		L-M-C

MOM Bouresla

EMPLACEMENT 7 R13 x 386. 390

Bd-	8-89	-							I			1	
iche	Nbre yeux		rrement mj/déb		Ferti- lité	Flor	mi/f			raison mi/v		Maturit é	
1 2	4 3	18,3 M.3	25,31 1831	1	0,7	6.6	106 +M	14,6	17.8	21.8	248	20,9	
4	2	4.3	11.3 *	0	Crappe: G - M - P Dim: Compacitó: L - M - C Pour: Mill:								
5	14	4.3	14.3 4	0	Baie: TG - G - M - P Dim: disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus								
	D	le 11.	3 ,96		Couleur : R-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré								
			(-5)		Saveur : s - m - ar - fox - herb Pópins : avec - apyrène								
		,	7		Fort :			v	<u>igueur</u>	:			
	-												

Mes de ro

doctorlantanlantanlantanl

ANNEEL: 1997

HOM Bouresla mi

Bd. 8.89.

Innimiani

EMPLACMMENT 4 R 43 1386.390

iche	Whre	Débou début	rranen! mi/dab	tibro quap	Forti-		ralson mi/E		vé. děbůt		 matur 116
1 , 1 , 5	2 3 · 2 11 TL			0 21 1 2 /5	Couleu	TC - C discosp g : B-C : s	Mil ; - !! oh-ell i-Rs- m - a	l : - P - OV-O RG-N r - fo yrène	: bov-cy dus	Compa L-fus : Inc	: 1 :: 0

ANUEL: A	1998 Juresla	100	MEDACEBERO:	7 R.13 A &	386.390 1	到
	mi Débourrement début mi/déb			raison mi/f fin	Võraison dēbut mi/v	fin Maturité
2 2 2 2 4 3 4		0 2 3 00 Ba 0	2.5.5 rappe : G - G our : ale : TG - G disc-s	28.5 2.6 +4 M - P Dim Mill: 5 - M - P D sph-ell-ov- Gr-Rs-Rg-N m - ar - f c - apyrène	im: compa im: obov-cyl-fus Jus: inc ox - herb	17.8 621.9 +6 citó: 1, + 11 -C.

N° d'ordre :

Bouresla

Désignation : Emplacement : 7R13 1-386-3904.5

dantadantadantadantad

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183 - globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 - cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 - jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 166 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalées - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 199 - séteuses 200 - veloutées 201 - aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 - à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 210 - entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures: glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 - duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 - sans villosité laineuse 283

Limbe: glabre 220 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 - duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 - sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 - jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233,

A pétiole glabre 234 - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 - duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

- Calvo 92

Nº d'ordre : Désignation : Bouresla 7R13 s. 386-390 s.2

daatadaatadaatadaatadaatad

Emplacement :

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

A contour uni - anguleux - côte[6.9] Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250.

ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 264) - à raies 255 - vert 256. Noeuds

ventre coloré 267 - à raies 258 - vert 259.

verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - moyenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265.

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : mâle 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 91

N° d'ordre : Désignation : Emplacement : Bouresla 7 R 130-386,390A-1

dantadantadantadantad

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142)- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144 - séteux 145) - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.) limbe : glabre 150 - séteux [5] - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 2/15

Limbe: plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyenne-

ment bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Face supérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166. rouge 166.

> Face inférieure : verte 167 - partiellement rouge 168/entièrement rouge 169.

Couleur du limbe : vert clair - vert franc - vert foncé - autre.

PETIOLE

Long 170 - moyen 1/1/- court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - partiellement coloré 177 - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement - totalement.

Bouresla N° d'ordre : 7R 13 A. 386-390 A. 1 Désignation :

Emplacement :

GRAPPE

dantadantadantadantad

Grosse 68 - Moyenne 66 \rightarrow Petite 70 (dimensions $\frac{1}{4}x$). Lâche 71 - Moyenne (2) - Compacte (3) A pédoncule non visible 74 - visible 75 / long 76. A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79. Axe de la rafle coloré 80 /- non coloré 81.

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 de taille régulière irrégulière (dimensions 25 x 23). De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91, Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94. Coloration régulière - irrégulière. Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97/ - ovoïde 98 troncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104. A jus incolore 105) - coloré 106. A ombilic très apparent - peu apparent. A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109. Région ombilicale déprimée 110 non déprimée 111. A saveur neutre 1(2) - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 herbacée 117 - spéciale 118. De séparation facile (égreneuse) - difficile. A pédicelle long 119 - moyen 120 > court 121. A pédicelle de couleur : verte 122) - rouge 123 - irrégulière 124. A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127. A bourrelet évident 128 - peu apparent 129/ A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132. A pinceau : coloré 133 - non coloré 1/34, A peau fine 135 - moyenne $1\beta6$) - épaisse 137. A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse. Avec pepins - apyrène.

-Calvo 93

DENOMINATION : EMPLACEMENT : Bouresla 7R 13D. 386-390A.5

nlantanlantanlantanlantanl

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3). : grêle (1) - moyen (2) - fort (3). Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2).

Unntroducti<mark>on brother biol</mark>

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4).

pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3).

glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) - duveteux (8) - cotonneux (9).

entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3). Surface

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (51) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4).

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6))violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - coniques (2) - arrondis (3). : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3). Yeux

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2). : saillant (1) - effacé (2).

: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) - rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 97

```
Désignation: Bouresla
Emplacement: 7 R 13 A 386, 390
                                  : 1 - 2 - 3
Angle des nervures
                                  : 4 - 5 - 6
Sexe
                                  : 7-8-9
Li/L
                                  : (10 - (11)
L2/L
                                  : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                 : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Sup.
                                 : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                 : 25 - 26 -- 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                   : (267
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
                                  : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - 36 - (37) - 38- (39)
Forme sinus latéral Sup.
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert
                                   : (271)
                                   : (40) - 41
 Dents : forme
                                   : 42 - 43 - 44
 Dents (angle)
                                   : (45) - 46 - 47
 Angle du lobe terminal
 Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
 Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                   : 60 - 61 - 62
 Angle des nervures L3 L'3
                                   : 63 - 64 - 65 - 66 - 67
 Largeur du sinus pétiolaire
 Dent terminale du lobe latéral supérieur
 Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal
 Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale
 Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües
```

Ho d'ordre :

dantadantadantadantad

Romes 94